

СЕЗОНА 2022/2023

Извјештај о надзору над инфлуенцом у 7. недјељи 2023. године (13.02 - 19.02.2023) у Републици Српској

У 7. недјељи 2023. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 4.410 акутних респираторних инфекција (ARI), док је оболења сличних грипи (ILI) регистровано 1.598. У болницима у Републици Српској у овој седмици пријављена су 32 оболела од тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то 9 у УКЦ Републике Српске, 14 у ОБ Градишака и пет у ОБ Добој и четири у ОБ Невесиње. Од почетка сезоне укупно је пријављено 64.126 ARI инфекција, ILI инфекција 23.072, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 725.

*У оквиру овог седмичног извјештаја, SARI случајеви подразумијевају хоспитализоване SARI случајеве код којих је искључено оболење COVID-19.

Од почетка сезоне 2022/2023, највећу учесталост пријављивања оболења сличних грипи (ILI) су имале регије Источно Сарајево и Фоча, а најмање Бијељина и Зворник, док је највише SARI случајева пријављено у ОБ Градишака и УКЦ Републике Српске. Када је у питању старосна заступљеност, највећи број оболелих од ARI и ILI инфекција је у узрасној групи 5-14, док је у категорији SARI инфекција највише оболелих у узрасној групи 0-4 године.

По процентуалном учешћу, досад је од ILI инфекција у Републици Српској оболјело 2,03% становништва.

Тренутна епидемиолошка ситуација показује осцилаторно кретање инциденције оболијевања од све три групе инфекција у односу на претходну недјељу. Нешто већи број ARI инфекција је пријављен у претходној недјељи, што је посљедица циркулисања више врста вируса типичних за ово доба године због којих се пациенти јављају љекару на примарном нивоу здравствене заштите. Најважнији податак који говори о тренутној епидемиолошкој ситуацији је да је број инфекција које захтијевају хоспитализацију у константном опадању након врха тренда кретања у 3. недјељи. Поредећи ове податке са претходном сезоном или још боље са двије сезоне прије пандемије вируса корона, све три групе инфекција показују веће вриједности у односу на те сезоне у истом овом периоду.

Тестирање

У референтној лабораторији Института за јавно здравство Републике Српске у 7. недјељи тестирано је један SARI и пет ILI узорака на вирусе инфлуенце, SARS-CoV-2 и респираторни синцицијални вирус (RSV).

Тестирани SARI узорак је негативан на сва три горе наведена вируса.

Од тестираних ILI узорака, један је био позитиван на вирус инфлуенце A/H1N1pdm09, а други на вирус инфлуенце Б (Victoria).

Позитивни узорци су утврђени код пациентата предшколског узраста и средње животне доби.

Смртни исходи

У 7. недјељи није било пријављених смртних исхода од посљедица тешке акутне респираторне инфекције (SARI).


Епидемиолошка ситуација у Европи

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести и Светска здравствена организација, активност вируса инфлуенце је у стабилним вриједностима без значајније промјене у односу на претходну недјељу (позитивности сентинел узорака са примарног нивоа је 25%). У европском региону 23 од 38 земаља су пријавиле високу активност вируса инфлуенце и/или регионалну и широку распрострањеност вируса инфлуенце. Холандија, Израле, Француска, Словенија, Арменија, Данска и Швајцарска су пријавиле преко 40% позитивности сентинел узорака са примарног нивоа, док је преко 10% позитивности узорака са болничког нивоа (SARI) пријављено у осам земаља. Од почетка сезоне у Европи су детектовани вируси инфлуенце тип А и тип Б, а најзаступљенији је сој вируса инфлуенце A/H1N1pdm09.


Препоруке и мјере превенције

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима где бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пациентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избегавати близак контакт са обольелим.


Инциденција ARI на 100.000 становника по недјељама у Републици Српској у сезони 2022/23




ИнциденцијаILI на 100.000 становника по недјељама у Републици Српској у сезони 2022/23



Инциденција SARI на 100.000 становника по недјељама у Републици Српској у сезони 2022/23



Број пријављених оболелих од SARI у болницима у Републици Српској у сезони 2022/23



Извјештај припремила: доц. др Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију