

СЕЗОНА 2020/2021

Извјештај о надзору над инфлуенцом у 13. недјељи 2021. године (29.03.2021 - 04.04.2021) у Републици Српској

У 13. недјељи надзора над инфлуенцом у сезони 2020/2021, домови здравља Републике Српске су пријавили 1.847 акутних респираторних инфекција (ARI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 928. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављене су четири особе обољеле од тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то у Универзитетском клиничком центру Републике Српске. Од почетка сезоне укупно је пријављено 58.808 ARI инфекција, 16.323 ILI инфекција, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 474.

Од почетка надзора над инфлуенцом Регионални центар Источно Сарајево има највећу стопу инциденције обољења сличних грипи (ILI), а Добој и Требиње најмању. Највише SARI случајева од почетка сезоне пријављено је у Општој болници Градишка. ARI инфекције ове недјеље показују пад а ILI инфекције благи раст у односу на претходну. Од почетка надзора над инфлуенцом највећи број обољелих од ILI инфекција је у узрасној групи 30 - 64, док је у категорији SARI инфекција највише обољелих у узрасној групи 30 – 64 и узрасној групи > 65.

У протеклој недјељи Институту за јавно здравство Републике Српске је пријављен један смртни SARI исходи. Ради се о особи старије животне доби са коморбидитетом.

У 13. недјељи у Институту за јавно здравство Републике Српске тестирана су три ILI узорка, који нису били позитивни на вирусе инфлуенце.


У складу са подацима Европског центра за превенцију и контролу болести за 13. недјељу, активност вируса инфлуенце у Европи је на вансезонском нивоу. Вируси инфлуенце у овој недјељи су детектовани у једном сентинел узорку док су спорадично детектовани у не – сентинел узорцима, и то вируси инфлуенце типа Б. У болницама у овој недјељи нису евидентирани лабораторијски потврђени случајеви инфлуенце.

Европски центар за превенцију и контролу болести указује да пандемија, услед утицаја на здравствене установе и капацитете тестирања у земљама, негативно утиче на извјештавање о епидемиолошким и вирусолошким подацима о грипи током сезоне 2019/2020. У складу са наведеним, ако се ситуација и даље настави, податке је потребно тумачити са опрезом.


Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу.



Број пријављених обољелих од SARI у болницама у Републици Српској у сезони 2020/2021



Инциденција SARI на 100.000 становника по недјељама у Републици Српској у сезони 2020/2021



Припремила: Служба за епидемиологију